

مجاز است.

استفاده از: —

گند سری سؤال: یک (۱)

امام علی (ع). شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. کدامیک از عوامل زیر نقش مهمتری را از لحاظ دریافت انرژی خورشیدی هر محل دارند؟

الف. طول روز ب. ارتفاع ج. زاویه سطوح د. ابرناکی آسمان

۲. ارومیه در دی ماه انرژی تابشی بیشتری را نسبت به سواحل شمالی ایران دریافت می کند. این تفاوت بواسطه اثر بخشی کدام عامل است؟

الف. ضخامت جو ب. عرض جغرافیایی ج. ابرناکی آسمان د. تاثیر خزر

۳. با ملاحظه طبقه بندی مناطق تابشی ایران، زاگرس جنوبی در کدام ناحیه دریافت انرژی تابش قرار دارد؟

الف. خیلی زیاد ب. زیاد ج. متوسط د. کم

۴. کدام عامل نقش اساسی را در کنترل بیشینه ماهانه بارندگی سقز ایفا می کند؟

الف. ترکیب بادهای غربی و جبهه قطبی ب. توپوگرافی

ج. جریان های مدیترانه ای د. عرض جغرافیایی

۵. علت اصلی عدم گسترش پرفشار جنب حاره ای در سطح کمتر از ۷۰۰ هکتو پاسکال در ایران چیست؟

الف. نفوذ جریانات غربی ب. توپوگرافی و عامل ارتفاع

ج. گرمایش سطحی د. عرض جغرافیایی

۶. مسدود شدن مسیر ورود سیکلونهاى بارش زا در تابستان متأثر از عملکرد کدام عامل است؟

الف. صعود هوای سطحی ب. نفوذ موج های بلند

ج. جابجائی محور بادهای غربی د. حاکمیت پرفشار آزور

۷. کدامیک از نواحی اقلیمی ایران عمدتاً متأثر از توده هوای CP می باشند؟

الف. شمال شرق ب. شمال غرب ج. جنوب شرق د. جنوب غرب

۸. ویژگی بارز ارتفاعات زردکوه بختیاری از لحاظ شاخص های اقلیمی ایران چیست؟

الف. کانون حداکثر برودتی ب. کانون حداکثر دریافت تابش

ج. کانون حداکثر تغییرات دما د. قله بارش ایران

۹. در فصل زمستان بالاترین دما در کدام ناحیه ایران قابل اندازه گیری است؟

الف. جزایر جنوبی ب. جلگه خوزستان ج. منطقه بلوچستان د. منطقه بشاگرد

۱۰. وجود روزهای گرم تابستانه همدان عمدتاً منبث از تاثیر کدام عامل است؟

الف. عرض جغرافیایی ب. ارتفاع ج. کمبود رطوبت نسبی د. استیلای پرفشار آزور

۱۱. ضریب تغییر پذیری دما در کدامیک از شهر های زیر کمتر است؟

الف. ایرانشهر ب. رامسر ج. اصفهان د. همدان

۱۲. حدوث یخبندان در سواحل جنوبی ایران در چه دوره ای از سال از احتمال بیشتری بر خوردار است؟

الف. اوایل دی ماه ب. نیمه دوم بهمن ماه ج. اواسط آذر ماه د. اوایل بهمن ماه

نام درس: آب و هوای ایران
 رشته تحصیلی و کد درس: جغرافیای انسانی و طبیعی (۱۲۱۶۰۵۹)
 زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

کد سری سؤال: یک (۱)	استفاده از: —	مجاز است.		
۱۳. در دوره سرد سال بیشترین فشار هوا در چه منطقه ای از ایران قرار دارد؟	الف. ارتفاعات غربی	ب. دشت خوزستان	ج. ارتفاعات شمال شرق	د. چاله های شرقی
۱۴. کدام گزینه زیر بیانگر فراوانی زمانی توفان های رعد و برق ایران می باشد؟	الف. فروردین ماه	ب. اردیبهشت ماه	ج. خرداد ماه	د. اسفند ماه
۱۵. بیشینه و کمینه نم نسبی در ایران به ترتیب در چه ماه هایی از سال مشاهده می شود؟	الف. بهمن - تیر	ب. آذر - مرداد	ج. دی. تیر	د. بهمن. مرداد
۱۶. بارش های همرفتی غالباً در کدام فصل سال بیشتر بوقوع می پیوندد؟	الف. بهار	ب. تابستان	ج. پاییز	د. زمستان
۱۷. پس از سواحل خزر، بیشینه بارش روزانه ایران بر کدام منطقه جغرافیایی منطبق است؟	الف. دامنه های جنوبی البرز	ب. ارتفاعات البرز غربی	ج. ارتفاعات زاگرس	د. ارتفاعات شمال شرق
۱۸. بیشینه بارش بهاره ایران در کدام منطقه جغرافیایی مشاهده می شود؟	الف. سواحل غربی خزر	ب. سواحل شرقی خزر	ج. ارتفاعات میانی زاگرس	د. شمال غرب
۱۹. از لحاظ پراکنش فصلی، کدامیک از مناطق زیر سهم بارش تابستانه بیشتری دارد؟	الف. کرانه جنوبی زاگرس	ب. ناحیه شمال غرب	ج. جنوب شرق	د. جلگه خوزستان
۲۰. هسته بیشینه بارندگی زمستانه ایران در کدام منطقه قرار دارد؟	الف. تالاب انزلی	ب. ارتفاعات آذربایجان	ج. کردستان	د. یاسوج
۲۱. در آذربایجان پربارش ترین ماه سال کدام است؟	الف. اردیبهشت	ب. آذر	ج. دی	د. بهمن
۲۲. در تقسیم بندی نواحی بارشی ایران، کدامیک از نواحی بارشی زیر همگنی بیشتری را با هم دارند؟	الف. خزر غربی. خزر شرقی	ب. کردستان. خراسان شمالی	ج. خزر شرقی. کردستان	د. خزر غربی - خراسان شمالی
۲۳. در ناحیه خزر شرقی، عامل عمده شکل گیری بارندگی های آغاز پاییز کدام است؟	الف. گسترش باد های غربی	ب. نفوذ جریانات سیبری	ج. نفوذ سیکلون های محلی	د. همرفت های وزشی
۲۴. در کدامیک از مناطق ایران رابطه چندان محکمی بین بارش و ارتفاع ملاحظه نمی شود؟	الف. شمال	ب. جنوب	ج. شرق	د. غرب
۲۵. در مقایسه روزهای یخبندان نواحی مختلف ایران، کدام ناحیه از درجه ناهمگنی بیشتری برخوردار است؟	الف. ناحیه کوهپایه ای بیرونی	ب. ناحیه خزری	ج. ارتفاعات شمال شرق	د. ناحیه مرکزی
۲۶. بیشینه بارندگی در بخش غربی خزر مربوط به کدام ماه سال است؟	الف. مهر	ب. آبان	ج. آذر	د. دی

نام درس: آب و هوای ایران
رشته تحصیلی و کد درس: جغرافیای انسانی و طبیعی (۱۲۱۶۰۵۹)
زمان آزمون: تستی: ۴۰ تشریحی: — دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗
کد سری سؤال: یک (۱)
استفاده از: —
مجاز است.

۲۷. بیشترین بی ثباتی بارش در کدامیک از شهر های ناحیه شمال ایران مشاهده شده است ؟
الف. گرگان ب. ساری ج. رودبار د. رشت
۲۸. علت اصلی توزیع نابسامان بارش نواحی کوهستانی چیست؟
الف. عامل توپوگرافی ب. نوسانات باد های غربی ج. جریانات همرفت د. تاثیر جبهه های محلی
۲۹. بیشترین تعداد روزهای بارندگی در کدامیک از شهر های ناحیه جنوب ایران گزارش شده است؟
الف. سراوان ب. کهنوج ج. بندر لنگه د. خاش
۳۰. کدام ناحیه زیر روزهای یخبندان ندارد؟
الف. کوهستانی ب. خزری ج. جنوب د. جنوب شرق