

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب

گذ سوی سؤال: یک (۱)

امام خمینی^(ر): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. کدام گزینه درست قر است؟

الف. در آند همیشه کاهش انجام می‌شود.

ب. در آند همیشه اکسایش انجام می‌شود.

ج. در پیل گالوانی آند الکترود مثبت است.

۲. صحیح‌ترین گزینه در مورد پل نمکی کدام است؟

الف. پل نمکی را از محلول اشباع KCl پر می‌کنند، زیرا تحرک یونی K^+ تقریباً برابر تحرک یونی Cl^- است.

ب. پل نمکی را از محلول اشباع KCl پر می‌کنند، زیرا انحلال پذیری آن در آب زیاد است.

ج. پل نمکی را از محلول اشباع KCl پر می‌کنند، زیرا یک الکترولیت ۱:۱ بوده و تحرک یونی کاتیون و آنیون آن تقریباً برابر است.

د. پل نمکی را می‌توان با هر الکترولیت که انحلال پذیری زیادی دارد و هدایت کاتیون و آنیون آن برابر است پر کرد.

۳. اگر فعالیت یون مس در محلول برابر ۱/۰۰ مولار باشد، پتانسیل الکترود مس در این محلول در $25^\circ C$ کدام است؟

$$\left(\frac{E}{Cu^{2+}} \right) = 0/337$$

الف. ۰/۳۰۷ ولت ب. ۰/۳۱۱ ولت ج. ۰/۲۹۵ ولت د. ۰/۲۷۸ ولت

۴. پیل $Pt | H_2PtCl_6 | (HCl), (0/2M) || SHE$ برای کدام مورد به کار می‌رود؟

الف. تعیین پتانسیل استاندارد الکترود پلاتین

ب. تعیین انحلال پذیری رسوب H_2PtCl_6

ج. تعیین ثابت تشکیل کمپلکس $H_2PtCl_6^{3-}$

د. تعیین ثابت اسیدی H_2PtCl_6

۵. در صورتی که اندازه گیری یون کلرید با یک الکترود کلریدگزین هدف باشد، از کدام الکترود مرجع بهتر است استفاده شود؟

الف. جیوه - جیوه (I) سولفات

ب. نقره - نقره کلرید (NCE)

ج. کالومل اشباع (SCE)

۶. علت استفاده از الکترودهای مرجع با تماس دوگانه کدام است؟

الف. جلوگیری از آلودگی محلول درونی الکترود

ب. جلوگیری از آلودگی محلول مورد سنجش

ج. هر چه پایدار کردن پتانسیل الکترود مرجع

د. کاهش قابل ملاحظه پتانسیل تماسی مایع

همیار دانشجو

کارشناسی (سترن)-جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازמון (دقيقه): تست: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذرسن: شیمی محض و کاربردی (۱۱۱۴۰۲۳)

نام درس: شیمی تجزیه ۲

استفاده از: ماشین حساب

گذرسن سوال: یک (۱)

مجاز است.

مجاز است.

۷. برای اندازه گیری Br^- با استفاده از الکترود یون گزین، نوع الکترود کدام است؟

الف. غشای شیشه‌ای

ب. غشای مایع

ج. غشای فریتی

د. غشای حالت جامد

۸. در مورد محدودیت‌های الکترود شیشه‌ای، کدام گزینه درست نر است؟

الف. خطای قلیایی ناشی از قلیایی بودن محلول و غلظت بالای یون OH^- است.

ب. علت خطای اسیدی، وجود یک اسید قوی در محلول مورد سنجش است.

ج. خطای قلیایی از غلظت نسبتاً زیاد کاتیون‌های یک ظرفیتی در محلول ناشی می‌شود.

د. مقدار خطای قلیایی و اسیدی به نوع الکترولیت و ساختار شیشه بستگی دارد.

۹. پیل الکترود شیشه/کالومل در محلول بافر با $pH = 7$ ، پتانسیل 0.057 ولت و در محلول مجھول پتانسیل 0.260 ولت را

نشان می‌دهد. pH محلول مجھول کدام است؟

د. $2/75$

ج. $1/69$

ب. $10/43$

الف. $10/67$

۱۰. در مورد علت ایجاد پتانسیل در الکترود حالت جامد فلورید گزین که در آن از بلور فلورید لانتانیم (III) استفاده می‌شود،

درست ترین گزینه کدام است؟

الف. مبادله یون فلورید داخل محلول با یون فلورید موجود در شبکه غشای حالت جامد

ب. نفوذ یون‌های فلورید از داخل محلول مجھول به درون شبکه فلورید لانتانیم

ج. مهاجرت یون‌های فلورید به علت وجود فضاهای خالی آنیون در بلور فلورید لانتانیم

د. چون یون فلورید نمی‌تواند بار الکتریکی را از غشاء فلورید لانتانیم انتقال دهد، پتانسیل ایجاد می‌شود.

۱۱. در مورد وسائل اندازه گیری رایج برای پتانسیل، کدام گزینه درست نر است؟

الف. پتانسیل سنج برای پیلهای با مقاومت داخلی زیاد بکار می‌رود.

ب. pH سنج یا یون گزین سنج برای پیلهای با مقاومت داخلی خیلی زیاد بکار می‌رود.

ج. ولت سنج دیجیتال، برای پیلهای با مقاومت درونی خیلی زیاد بکار می‌رود.

د. پتانسیل سنج، pH سنج و ولت سنج دیجیتال هر سه برای پیلهای با مقاومت درونی زیاد بکار می‌روند.

۱۲. برای افزایش دامنه خطی نمودار درجه بندی در الکترودهای یون گزین، کدام گزینه درست نر است؟

الف. افزایش محلول تنظیم کننده قدرت یونی به استانداردها و مجھولات.

ب. تهیه محلول‌های استاندارد با پارامتر فعالیت به جای غلظت.

ج. تهیه محلول‌های استاندارد با پارامتر غلظت بطور خیلی دقیق.

د. استفاده از الکترود مرجع با تماس دوکانه همراه با الکترود شناساگر.

۱۳. در روشهای پتانسیل سنجی، در موقعی که نمونه حاوی مقادیر زیادی یون مزاحم است، کدام روش مناسب نر است؟

ب. روش قرائت مستقیم

الف. روش تفیریق استاندارد

د. روش افزایش استاندارد متعدد

ج. تیتراسیون پتانسیل سنجی

hdaneshjoo.ir

۸۹-۹۰ نیمسال اول

صفحه ۲ از ۵

سال همت مضاعف و کار مضاعف

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو

همیار دانشجو

کارشناسی (سترن) - جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

نام درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی / گذرنامه: شیمی محض و کاربردی (۱۱۱۴۰۲۳)

مجاز است.


استفاده از: ماشین حساب

گذرنامه سوال: یک (۱)

۱۴. کدام گزینه از مزایای روش‌های پتانسیل سنجی نیست؟

- الف. غیر مخرب‌اند ب. کم هزینه‌اند ج. سریع‌اند
د. تجزیه پیوسته امکان پذیر است

۱۵. پتانسیل نقطه هم ارزی در سنجش پتانسیل سنجی Ce^{4+} با Sn^{2+} ، کدام است؟



الف. ۰/۵۸ ولت ب. ۰/۶۴ ولت ج. ۱/۱۲ ولت د. ۰/۸۸ ولت

۱۶. کدام مورد از مزایای روش سنجش پتانسیل سنجی دیفرانسیلی نیست؟

- الف. پتانسیل تماسی کم است.
ب. به الکترود مرتع نیاز ندارند.

ج. در نقطه هم ارزی قله نوک تیز ایجاد می‌شود. د. پل نمکی نیاز ندارد.

۱۷. در الکترولیز کدام محلول، الکترود کار آند خواهد بود؟

الف. سرب (II) ب. مس (II) ج. آهن (III) د. منگنز (II)

۱۸. پتانسیل بیشتر از پتانسیل برگشت پذیر الکترود، که برای انجام واکنش الکترودی با سرعت معین لازم است، چیست؟

الف. پتانسیل تجزیه (E_d)
ب. پتانسیل فرمال
ج. پتانسیل اضافی
د. پتانسیل برگشت ناپذیر

۱۹. در مورد روش‌های ولتا متری، کدام گزینه صحیح تر است؟

الف. کرونوپتانسیومتری جزی روش‌های ولتا متری در جریان ناچیز است.

ب. پلاروگرافی جریان مستقیم و جریان متناوب، جزی روش‌های ولتا متری در جریان کنترل شده‌اند.

ج. کرونوپتانسیومتری جزی روش‌های پتانسیل سنجی (جریان صفر) است.

د. کولن سنجی و الکترو وزنی در مجموعه روش‌های میکرو الکترولیز قرار دارند.

۲۰. کدام روش تجزیه‌ای زیر در شرایط کامل قطبش غلطی انجام می‌شود؟

الف. پتانسیل سنجی ب. پلاروگرافی ج. الکترووزنی
د. کولن سنجی

۲۱. در پلاروگرافی به منظور افزایش سهم نفوذ در انتقال جرم به سطح الکترود کار، از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف. اضافه کردن مواد شیمیایی فعال سطحی به محلولها

ب. عبور دادن کاز ازت در زمان مشخصی از محلولها

ج. استفاده از یک مدار سه الکترودی به جای مدار دو الکترودی

د. اضافه کردن یک الکترولیت کمکی با غلظت زیاد به محلولها

hdaneshjoo.ir

۸۹-۹۰ نیمسال اول

صفحه ۳ از ۵

سال همت مضاعف و کار مضاعف

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو

همیار دانشجو

کارشناسی (سترن)-جبرانی ارشد

hdaneshjoo.ir

زمان ازمن (دقيقه): تست: ۶۰ تشریحی: ۰۶

نام درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: شیمی محض و کاربردی (۱۱۱۴۰۲۳)

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب

گذ سوی سؤال: یک (۱)

۲۲. کدام فرض برای بدست آوردن معادله ایلکویچ، نادرست است؟

الف. سرعت جاری شدن قطره جیوه ثابت است.

ب. قطره های جیوه کاملاً کروی هستند.

ج. محلول مورد تجزیه به هم زده می شود.

د. نظریه نفوذ خطی کوتول، معتبر است.

۲۳. در مورد روش های کولن سنجی، کدام گزینه درست تر است؟

الف. در کولن سنجی در جریان کنترل شده، ماده تیتر کننده بطور کمی در الکترود کار تولید می شود.

ب. کولن سنجی در پتانسیل ثابت، به تیتراسیون کولن سنجی نیز معروف است.

ج. در کولن سنجی در پتانسیل کنترل شده، از یک مدار ۲ الکترودی استفاده می شود.

د. در کولن سنجی در جریان کنترل شده، مقدار Q از انتگرال نمودار I بر حسب t محاسبه می شود.

۲۴. در ارتباط با روش الکترو وزنی، کدام گزینه درست تر است؟

الف. به هم زدن محلول باعث بدتر شدن کیفیت رسوب می شود.

ب. برای جلوگیری از آزاد شدن کاز H_2 و در نتیجه خراب شدن رسوب، یون نیترات به محلول اضافه می شود.

ج. چگالی جریان و دما اثری بر مشخصات فیزیکی رسوبها ندارند.

د. همه فلزات را می توان روی کاتد توری پلاتین رسوب داد و این فرایند تحت تأثیر نوع رسوب قرار ندارد.

۲۵. رابطه ابعادی هدایت الکتریکی مولی کدام است؟

ب. $S.mole^{-1}.Cm^{-1}$

الف. $S.mole.Cm^{-3}$

د. $S.mole^{-1}.Cm^3$

ج. $S.mole^{-1}.Cm^{-2}$

۲۶. در تیتراسیون هدایت سنجی محلول اسید کلریدریک با سود، نقش یون Na^+ در هدایت الکتریکی چگونه است؟

الف. تا نقطه هم ارزی صعودی و از آن به بعد ثابت است.

ب. تا نقطه هم ارزی نزولی و بعد از آن صعودی است.

ج. از ابتدای سنجش تا پایان کار همواره صعودی است.

د. از ابتدای سنجش تا پایان کار همواره نزولی است.

سؤالات تشریحی

* بارم هر سؤال ۱/۲۵ نمره می باشد.

۱. علت استفاده از مدار سه الکترودی، در دستگاههای مبتنی بر الکتروولیز را شرح دهید.

۲. شرایط تجزیه کیفی چند جزیی را با روش پلاروگرافی شرح دهید.

۳. مقدار ۱۰۰ میلی لیتر محلول استیک اسید $M = ۰/۰۵$ با سدیم هیدروکسید $M = ۰/۰۱$ بطريق هدایت سنگی تیتر می شود. هدایت ویژه محلول را در شروع تیتراسیون و در نقطه هم ارزی محاسبه کنید.

$$\lambda_{Na^+}^\circ = ۵۰/۱, \lambda_{C_۲H_۳O^-}^\circ = ۴۰/۹. (K_a = ۱ \times ۱۰^{-۵})$$

$$\lambda_{H^+}^\circ = ۳۴۹/۸$$

۴. پتانسیل فرمال الکترود چیست؟

۵. پیل متشكل از الکترود مس گزین - مرجع، اگر درون ۵۰ میلی لیتر محلول $Cu^{۲+}$ قرار داده شود، پتانسیل ۱۱۰ میلی ولت را نشان می دهد، بعد از افزایش ۵ میلی لیتر محلول استاندارد ۰/۱۰ مولار مس، پتانسیل آن ۱۳۰ میلی ولت می شود. غلظت محلول مس را محاسبه کنید.

۶. سه روش تجزیه کمی به طریق پلاروگرافی را شرح دهید.