

امام علی<sup>(ع)</sup>: برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. اگر در برنامه اصلاحی ۸ نسل تلاقی برگشتی انجام شده باشد سهم والد غیر تکراری (بخشنده) در ریخته ارثی نتاج برابر است با:

د. ۳۹/۱ درصد





ج. ۳۹/۰ درصد

ب. ۱۹/۵ درصد

الف. ۱۹/۰ درصد

۲. فرض کنید  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$ ,  $D'$  دو لاین خالص شبیه به هم و  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$ ,  $D'$  دو لاین خالص دیگر مشابه می‌باشند اگر هدف اصلاح گر تولید هیبرید

چهار جانبی یا دابل کراس باشد دیاگرام تلاقی عبارت است از:



۳. برای تعیین قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاین‌ها (G.C.A) از چه آزمونی استفاده می‌شود؟

الف. فقط آزمون پلی کراس

ب. فقط آزمون تاپ کراس

ج. آزمون پلی کراس و تاپ کراس

د. تلاقی دای آلل-آزمون پلی کراس، آزمون تاپ کراس

۴. در صورتی که افزایش یک آلل، در نهایت باعث تشییت آن آلل و کاهش فراوانی آلل دیگر و سرانجام به حذف آن منجر شود این پدیده را چه می‌نامند؟

د. دورگ‌گیری بین گونه‌ای

ب. رانده‌شدگی ژنتیکی

الف. پلی‌پلوئیدی

ج. جهش ژنی

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۵. تمام اثرات معکوسی که گیاه میزان بر زندگی حشره تغذیه کننده می‌گذارد را چه می‌نامند؟

د. موتاسیون

ج. تحمل

ب. آنتی بیوسیس

الف. عدم رغبت

۶. در گیاهان یونجه- گندم- پنبه و چغندر قند به ترتیب بهترین سطح پلولئید عبارت است از:

ب. هگزاپلولئید- تری پلولئید- دیپلولئید

الف. تترابلولئید- هگزاپلولئید- تری پلولئید

د. اتوترابلولئید- تترابلولئید- ترابلولئید- اتوترابلولئید

ج. تترابلولئید- هگزاپلولئید- تترابلولئید- تری پلولئید

۷. با توجه به تلاقي های زیر، کدام تلاقي هتروزیس بیشتری تولید می‌کند؟

ب. aabbCCddee × AABBccDDEE

الف. aaBBCDDDee × AABBCcdee

د. aabbcccddee × AAbbccddee

ج. aabbCCddEE × AABBccdee

۸. اگر میانگین والد برتر، والد نامرغوب، واریته شاهد به ترتیب برابر ۱۰۰، ۲۰ و ۸۰ باشد، در صورتی که میانگین نسل  $F_1$  برابر ۱۲۰ باشد درصد هتروزیس استاندارد برابر است با:

د. ۴۰

ج. ۱۰۰

ب. ۲۰

الف. ۵۰

۹. کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف. دیپلولئیدها در مقایسه با پلی پلولئیدها به تشعشع مقاوم ترند

ب. درصد و میزان جهش در هتروزیگوت ها نسبت به لینه‌های خالص بیشتر است

ج. سلول های میتوزی در مقایسه با سلول های میوزی به مواد موتاژن حساس ترند.

د. اگر لاین های خالص در معرض موتاژن قرار گیرند، گیاهان موتاژن بیشتری تولید می‌شود.

۱۰. عوامل ایجاد کننده تنوع در طبیعت عبارتند از:

ب. اینترگرسیون، پلی پلولئیدی، جهش زنی

الف. جهش زنی، پلی پلولئیدی، دورگ گیری بین گونه ای

د. رانده شدگی تصادفی، مهاجرت جهش کروموزومی

ج. جهش کروموزومی، اتوپلی پلولئیدی، رانده شدگی ژنتیکی

۱۱. در کدام یک از گیاهان زیر گلها هرگز باز نمی‌شوند و صد درصد از نظر گرده افشانی خود بارورند؟

د. فستوک یکساله

ج. جو

ب. کاهو

الف. برنج

۱۲. وضعیتی که در آن با وجود فعل بودن گرده و مادگی، امکان بذر از طریق خودباروری وجود ندارد را چه می‌نامند؟

د. آپومیکسی

ج. خودناسازگاری

ب. نرعقیمی ژنتیکی

الف. دایکوگامی

۱۳. کدام یک از گیاهان زیر دارای گلهای کامل هستند؟

د. یونجه

ج. برنج

ب. گوجه فرنگی

الف. چغندر قند

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۱۴. با فرض اینکه سیستم باروری در آفتابگردان از نوع خود ناسازگاری اسپوروفیتی است ژنوتیپ های حاصل از تلاقی دو لاین با ژنوتیپ

(♀)  $S_1S_2 \times S_1S_2$  عبارتند از .....ب.  $S_2S_3, S_2S_3$ 

الف. ○ (امکان باروری وجود ندارد)

د.  $S_2S_1, S_1S_1, S_1S_3, S_2S_1$ ج.  $S_2S_3, S_1S_1, S_2S_3, S_1S_3$ 

۱۵. با فرض اینکه سیستم نرعقیمی از نوع نرعقیمی ژنتیکی - سیتوپلاسمی باشد، کدام نوع ژنوتیپ کاملاً نرعقیم بوده و در تولید بذر هیبرید

تجاری پیاز به عنوان کدام والد در تلاقی در نظر گرفته می شود؟

د.  $(N)MsMs$  - نرج.  $(S)Msms$  - مادهب.  $(N)msms$  - نرالف.  $(S)msms$  - ماده

۱۶. در صورتی که ۱۰ لاین در طرح بلوکی با ۵ تکرار مورد مقایسه قرار گیرند با توجه به جدول تجزیه واریانس، وراثت پذیری عمومی

را محاسبه کنید.

منابع تغییر	df	Ms
تکرار	۴	
واریته	۹	۴۲۷/۹۵
خطا	۳۶	۵۰/۴۸

ب. ۶ درصد

الف. ۰ درصد

د. ۸۶ درصد

ج. ۸۸ درصد

۱۷. در کدام روش اصلاحی گیاهان خودگشن، تنوع به طور کامل حفظ می شود؟

د. بالک تک بذر

ج. روش شجره ای

ب. روش لینه خالص

الف. روش بالک

۱۸. در کدام روش اصلاحی گیاهان خودگشن عمل گزینش تا نسل های  $F_5$  یا  $F_6$  صورت نمی گیرد و گزینش طبیعی است؟

د. روش بالک تک بذر

ج. روش بلال به ردیف

ب. روش بالک

الف. روش شجره ای

۱۹. در روش شجره ای گیاهان خودگشن، عمل گزینش در چه نسلی انجام می پذیرد؟

ب. نسل های  $F_7$  یا  $F_6$  بعد از رسیدن به خلوصالف. در نسل های اولیه  $F_3$ د. نسل های آخر  $F_{10} - F_9$ ج. قبل از رسیدن به خلوص در نسل  $F_3$ 

۲۰. کدام یک از گیاهان زیر دارای گلهای یک جنسه هستند؟

د. شبدر

ج. نیشکر

ب. گندم

الف. ذرت

۲۱. افزایش تعداد کروموزوم های یک فرد دیپلوبloid را چه می نامند؟

ب. پلی پلوبئیدی

الف. ایتر گرسیون یا انتقال ژنتیکی

د. دو رگ گیری بین گونه ای

ج. رانده شدگی ژنتیکی

زمان آزمون: تستی: ۵۰ تشریحی: ۵۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: اصول اصلاح نباتات

رشته تحصیلی و کد درس: مهندسی علوم کشاورزی - (۱۴۱۱۰۸۴)

--

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

۲۲. کدام یک از گزینه‌های زیر جزو خصوصیات بذور هیبرید نمی‌باشد؟

الف. تشکیل خوب بذر در والد ماده

ب. عدم همزمانی کامل گلدهی در والدین نر و ماده

د. برگ‌داننده‌های نر باروری قوی در حالت استفاده از نر عقیمی

ج. انتقال آزاد و طبیعی دانه گرده از والد نر به ماده

۲۳. اگر تعداد لینه‌های اینبرد برابر ۱۰ باشد تعداد سینگل کراس و تری دی کراس چقدر می‌شود؟

الف. ۴۵ و ۳۶۰

ب. ۴۵ و ۳۶۰

ج. ۴۵ و ۳۶۰

د. کاهش رشد

ج. تغییرات ژنتیکی

ب. افزایش رشد

الف. مرگ گیاه

۲۴. پس از تأثیر موتاژن در نسل اول کدام یک از موارد مشاهده نمی‌گردد؟

۲۵. کدام روش اصلاحی در گیاهان دگرگشتن بهترین روش برای افزایش وفور ژن‌های مقاوم در یک جمعیت گیاهی است؟

الف. انتخاب دوره ای

ب. گزینش توده‌ای

ج. گزینش لینه اینبرد

د. واریته هیبرید

## سوالات تشریحی

۱. مراکز بین المللی مهمی که مسئولیت نگهداری و ارزیابی ذخائر توارثی را دارند (با ذکر محصول) بنویسید. (حداقل ۴ مرکز بین المللی نام برد شود) (۱ نمره)

۲. مقدار هتروزیس مشاهده شده برای یک صفت به چه عواملی بستگی دارد؟ در چه شرایطی تولید بذر هیبرید توصیه نمی‌شود؟ (۰/۷۵ نمره)

۳. انواع جهش از نظر منشأ را شرح دهید. (۲ نمره)

۴. تولید بذر هیبرید در بین کلونهای خودناسازگار را شرح دهید. (۲ نمره)

۵. هاپلوئیدهای مضاعف شده را توضیح دهید. (۰/۷۵ نمره)