



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۰۸۲۶

۱- بند آخر پنجه که به یک یا دو ناخن ختم می گردد چه نامیده می شود؟

۴. پنتامر

۳. اپیسترن

۲. اپی مر

۱. انیکیوم

۲- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر تعریف پی ران می باشد؟

۱. مهمترین بخش پا محسوب می شود که سطح آن اغلب مجهز به خار و دندان های تیز است

۲. شکل آن متغیر بوده و از سه تا پنج بند تشکیل می شود

۳. شکل آن بر حسب جنس و گونه حشره متفاوت بوده و به طور معمول در انتهای خار بزرگ، ثابت و یا متحرک است

۴. قطعه بسیار کوچکی است که بعد از پیش ران قرار دارد

۳- شیشه دانه خوار گندم در کدامیک از مراحل زندگی خود از دانه غلات تغذیه می کند؟

۲. شفیرگی و لارو

۱. در مرحله لاروی و حشره کامل

۴. فقط در مرحله لاروی

۳. حشره کامل و شفیره

۴- طبق نظر آقای واربورتون و پیکستون تعادل رطوبتی دانه های مختلف بر حسب رطوبت موجود در آن ها (در شرایط رطوبت نسبی ۶۵ تا ۷۰ درصد انبار) در بذر گندم، ذرت، برنج چه قدر باید باشد؟

۴. ۱۰ درصد

۳. ۱۳ درصد

۲. ۱۵ درصد

۱. ۷ درصد

۵- حشره انباری گونه *Dermestes maculatus* در هر سال چند نسل دارد؟

۴. ۴ نسل

۳. ۳ نسل

۲. ۱ نسل

۱. ۲ نسل

۶- طول دوره رشد جنینی در حشره *Trogoderma megatomoides Reitter* به چه عواملی بستگی دارد؟

۲. رطوبت و نور

۱. به مواد غذایی و رطوبت

۴. نور و گرما

۳. رطوبت و گرما

۷- آثار خسارت کدامیک از آفات قبیله *Anthrenini* زیر حمله ابزار استخوانی و محصولات پشمی است؟

Anthrenus museorum . ۲

Anthrenus verbasci . ۱

Anthrenus flavipes . ۴

Anthrenus serophilariae . ۳

۸- حشرات خانواده *Bostrychidae* در کدام یک از مناطق زیر پراکنده می باشد؟

۲. مناطق گرم‌سیر و نیمه گرم‌سیر

۱. مناطق سرد سیر و نیمه سرد سیر

۴. در همه مناطق آب و هوایی

۳. مناطق معتدل



۹- کدام نوع چوب بیشتر مورد آسیب خانواده Lyctidae قرار می گیرند؟

- | | |
|--|--|
| <p>۱. چوب هایی که از مواد نشاسته ای غنی باشند</p> <p>۲. چوب هایی که از پروتئین غنی باشند</p> | <p>۳. چوب هایی که حاوی کلسیم زیاد باشند</p> <p>۴. چوب هایی که حاوی پتاسیم زیاد باشند</p> |
|--|--|

۱۰- وجه تمایز خانواده Bostrichidae با خانواده Lyctidae کدام گزینه است؟

۱. رنگ
۲. رنگ بدن
۳. پنهان نبودن زیر پیش قفسه سینه
۴. اندازه شاخص

۱۱- افت Prost Stephanus truneatus به کدامیک از محصولات زراعی زیر خسارت بیشتری می‌رساند؟

- ## ١. گندم ٢. سیب زمینی ٣. لوبیا ٤. ذرت

-۱۲- سوسک نان از حشرات مهم کدام خانواده هستند؟

- | | |
|------------------------|--------------------|
| <i>Bostrychidae</i> .♀ | <i>Lyctidae</i> .♂ |
| <i>Arobiidae</i> .♀ | <i>ptinidae</i> .♂ |

۱۳- کدام گزینه از ویژگی های مهم خانواده Anobiidae است؟

۱. پنجه پاها ۷ بندی است
 ۲. حشرات کامل هنگام از پوب سوراخ های بزرگ ایجاد می کنند
 ۳. شاخک ها در این خانواده ۷ بندی است
 ۴. موقع گرفتن آن ها به اصطلاح خود را به مردن می زند

۱۴- کدام گزینه وجه تمایز دو گونه *Anobium punctatum* و *xestobium ruforillus* است؟

۱. نحوه زندگی

۲. ایجاد صدا در هنگام جفت گیری

۳. استفاده از چوب به عنوان غذا

۴. تعلق داشتن به خانواده‌ای از حشرات

۱۵- سوسک توتون از کدام گزینه تغذیه نمی کند؟

۱. چوب درختان زنده ۲. فرآورده های حیوانی
۳. کاغذ ۴. ایریشم

۱۶- سوسک های متعلق به کدام خانواده ظاهری شبیه به عنکبوت دارند؟

- | | |
|------------------------|--------------------|
| <i>Bostrychidae</i> .♀ | <i>Lyctidae</i> .♂ |
| <i>Arothriidae</i> .♂ | <i>Ptinidae</i> .♂ |



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۰۸۲۶

۱۷- فعالیت های بیولوژیک آفت (مانند جفت گیری و تخم ریزی) در سوسک عنکبوتی زرد در چه زمانی از شبانه روز صورت می گیرد؟

۱. صبح

۲. ظهر

۳. هنگام غروب یا طلوع آفتاب

۱۸- مهمترین آفت خسارت زای خانواده Nitidulidae مربوط به کدام جنس است؟

Ptinus . ۴

Niptus . ۳

Gibbium . ۲

Carpophilus . ۱

۱۹- کدام عبارت در باره شپش های دندانه دار صحیح است؟

۱. به خوردن فرآورده های گوشتی تمایل بیشتری نشان می دهد

۲. فقط از دانه گندم تغذیه می کند

۳. فقط از دانه های روغنی تغذیه می کند

۴. فقط از آرد غلات تغذیه می کند

۲۰- سوسک مکزیکی غلات متعلق به کدام خانواده است؟

Cryptophagidae . ۲

Lyctidae . ۱

Arobiidae . ۴

ptinidae . ۳

۲۱- آفت Therictodes heydeni برای اولین بار در ایران کجا مشاهده شد؟

۱. رشت

۲. تهران

۲۲- نام علمی لمبه گندم کدام یک از موارد زیر می باشد؟

Trogoderma versicolor . ۲

Trogoderma granarium . ۱

Anthrenus verbasci . ۴

Trogoderma megatomoides . ۳

۲۳- فرمول پنجه در سوسک زرد آرد کدام گزینه است؟

۱. همگن

۲. نا همگن - تعداد بند در پاهای جلویی و عقبی برابر است

۳. نا همگن - تعداد بند در پاهای میانی و عقبی برابر است

۴. نا همگن - تعداد بند در پاهای جلویی و میانی برابر است



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی) ۱۴۱۰۸۲۶

۴۴- یکی از تفاوت های مهم دو گونه *T. obscurus* و *T. molitor* کدام گزینه است؟

۴. رنگ بدن حشره

۳. رنگ تخم

۲. اندازه شاخص

۱. نوع شاخص

۴۵- کدام گزینه در رابطه با اثر عوامل اکولوژیکی بر سوسک های زرد و سیاه آرد صحیح است؟

۱. لاروهای این حشرات نسبت به گرسنگی مقاوم نیستند

۲. لاروهای این حشرات نسبت به سرما مقاوم نیستند

۳. لاروهای این حشرات هیچ گونه تحملی نسبت به گرمادارند

۴. حشرات کامل برای ادامه زندگی نیاز به رطوبت نسبی بالا دارند

۴۶- کدام خانواده به وسیله شاخص درازشان قابل تشخیص می باشند؟

Tenebrionidae . ۲

Cerambycidae . ۱

Cerytophagidae . ۴

Bruchidae . ۳

۴۷- سوسک عدس و سوسک ماشک از نظر رژیم تغذیه ای به ترتیب کدام گزینه می باشند؟

Olyphage-Polyphage . ۲

Polyphage - Polyphage . ۱

Polyphage- Olyphage . ۴

Olyphage - Olyphage . ۳

۴۸- حشره کامل سوسک ۴ نقطه ای حبوبات از نظر علاقه به غذا خوردن چگونه است و افزایش دما چه تاثیری بر طول عمر این حشره دارد؟

۲. برای تغذیه رغبتی نشان نمی دهد - کاهش

۱. به شدت علاقه مند به تغذیه - کاهش

۴. به شدت علاقه مند به تغذیه - افزایش

۳. برای تغذیه رغبتی نشان نمی دهد - افزایش

۴۹- کدام آفت به مزارع نخود فرنگی خسارت سنگینی وارد می کند؟

callosobruchus macultus . ۲

pachymerus acaciae . ۱

Sitophilus oryzae . ۴

Bruchus pisorum . ۳

۵۰- حشره ماده سوسک نخود فرنگی تخم های خود را عمدتا در کدام قسمت گیاه قرار می دهد؟

۴. روی غلاف

۳. روی ساقه

۲. روی برگ

۱. درون غلاف

۵۱- سوسک قهوه خوار متعلق به کدام خانواده از حشرات می باشد؟

Tenebrionidae . ۲

Cerambycidae . ۱

Cerytophagidae . ۴

Anthribidae . ۳

۳۲- مکان تخم گذاری مطلوب حشرات ماده شپشه گندم و برنج کدام قسمت گیاه است؟

۴. غلاف ساقه

۳. برگ

۲. ساقه

۱. دانه

۳۳- مهم ترین خسارت شپش های گندم و برنج مربوط به کدام گزینه است؟

۴. حشره ماده و نر

۳. حشره نر

۲. حشره ماده

۱. لارو

۳۴- خسارت شپش های گندم در کدامیک از شرایط انبار بیشتر است؟

۴. گرم و مرطوب

۳. گرم و خشک

۲. سرد و خشک

۱. سرد و مرطوب

۳۵- کدام ویژگی وجه تمایز شپش های برنج و ذرت نیست؟

۲. رنگ

۱. اندازه

۴. واکنش هایی مانند سکون در مقابل محرک های خارجی

۳. میزان تمایل به پرواز