

تذکرات :

- ۱) جواب صحیح سؤال را در پاسخنامه با مداد مشکی پررنگ علامت  بگذارید
۲) از نوشتمن و درج هر گونه علامت روی برگه سؤال جدا خودداری نمایید

۱- قسمت اعظم شیر تولیدی درجهان توسط کدام حیوان زیر صورت می پذیرد؟

- (۱) گوسفند (۲) گاو * (۳) شتر (۴) بز

۲- در دوره خشک از مصرف زیاد نمک خود داری نمایید چرا؟

- (۱) باعث نگهداری اب در بدن و ایجاد خیز یا ادم می شود
(۲) بیشتر در تلیسه های شکم اول رخ می دهد
(۳) موارد الف و ب صحیح است *
(۴) هضم غذا را با تاخیر می اندازد

۳- بیشترین مقدار تولید شیر بعد از زایش در کدام هفته است؟

- (۱) هفته اول (۲) هفته سوم (۳) هفته بین ۶-۸ * (۴) هفته ۱۵

۴- از زمان تولد تا پایان هفته اول گوساله های باید دقیق شود که :

- (۱) از شیر کامل استفاده شود
(۲) خوراندن آغوز مهم است
(۳) میزان مصرف آغوز و شیر ۱۰-۸ درصد وزن گوساله استفاده شود
(۴) همه موارد *

۵- یکی از مواد پر انرژی در تغذیه گوساله ها و گاوها ذرت است چرا؟

- (۱) عملکرد بالا
(۲) قابلیت هضم و خوشخوارکی
(۳) نشاسته بالا و فیبر کم
(۴) همه موارد *

۶- در نشخوار هر لقمه غذا که بالا اورده می شود چند بار جوییده می شود

- (۱) ۲۰ بار (۲) ۴۰-۵۰ بار * (۳) ۶۰ بار

۷- در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان معده حقیقی کدام است؟

- (۱) شکبه
(۲) نگاری
(۳) هزارلا
(۴) شیردان *

۸- نقش کنسانتره در تولید شیر:

- (۱) کم می کند (۲) زیاد می کند *
(۳) بی تاثیر است (۴) چربی را زیاد می کند

۹- موضوع عمده در سیلو کردن که باید مراعات شود:

- (۱) خرد نمودن محصول طی برداشت
(۳) فشرده کردن و درز گیری و رسیدن به شرایط بی هوایی (بدون اکسیژن)
(۲) پر نمودن سریع سیلو
(۴) همه موارد *

۱۰- رنگ گاوها نزد هلشتاین:

- (۱) زرد آهوبی
(۲) سیاه و سفید *
(۳) قهوه ای
(۴) حنایی
- (۱) در اثر دوشش نامساوی گاوها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند؟
(۲) چاق
(۳) زایش اول *
(۴) مسن
- (۱) کم تولید

- (۱۲) غده پستانی در دورهبیشترین رشد خود را دارد؟
 ۱) آبستنی * ۲) جنینی
 ۳) شیردهی ۴) قبل از بلوغ
- (۱۳) بهترین سن برای تلکیح تلیسه چند ماه است؟
 ۱) ۲۴ ۲) ۱۵ * ۳) ۱۲ ۴) ۱۷
- (۱۴) بهترین وزن برای تلکیح تلیسه چند کیلو گرم است؟
 ۱) ۳۰ ۲) ۳۵۰ * ۳) ۴۰۰ ۴) ۴۵۰
- (۱۵)-در نژادهای معروف گاو شیری کدام ۲ نژاد از نظر درصد چربی از بقیه بالاتر است?
 ۱) ایرشاير و هولشتاین ۲) جرسی و براونسوئیس ۳) جرسی و گرنزی * ۴) گرنزی و ایرشاير
- (۱۶)-بهترین تلکیح گاو شیری کدام است؟
 ۱) بعد از ظهر ۲) صبح
 ۳) ساعت بعداز شروع فحلی ۴) ۱۰ تا ۱۵ ساعت بعد از شروع فحلی *
- (۱۷)-اجسام خارجی مانند میخ و سیم که با غذا وارد معده نشخوارکنندگان بیشتر کجا تجمع می کنند؟
 ۱) سیرابی ۲) شیردان ۳) نگاری * ۴) هزارلا
- (۱۸)-افزايش درجه حرارت محیط در تولید شیر چه اثری دارد؟
 ۱) افزایش ۲) کاهش * ۳) بی تاثیر ۴) افزایش اندک
- (۱۹)-افزايش درجه حرارت محیط در تولید چربی چه تاثیری دارد؟
 ۱) افزایش * ۲) کاهش ۳) بی تاثیر ۴) کمی کاهش
- (۲۰)-کدامیک از نژادهای زیر دارای بالاترین درصد چربی است؟
 ۱) ایرشاير ۲) هو لشتاین ۳) براون سوئیس ۴) جرسی *
- (۲۱) کدامیک از نژادهای زیر دارای پایین ترین درصد چربی است؟
 ۱) هولشتاین * ۲) ایرشاير ۳) براون سوئیس ۴) جرسی
- (۲۲) کدامیک از موارد زیر در ارتباط با تغذیه بیش از حد در تلیسه صحیح نیست؟
 ۱) موجب کاهش درصد آبستنی ۲) باعث کاهش درصد سخت زایی *
 ۳) موجب کاهش تولید شیر طی دوران شیردهی ۴) باعث کاهش بافت ترشحی پستان
- (۲۳) دوره خشکی گاوهای شیری چند روز است؟
 ۱) ۶۰ روز * ۲) ۳۰ روز ۳) ۷۰ روز ۴) ۲۵ روز
- (۲۴) دوره خشکی گاوهای شیری شامل چند زیر دوره است؟
 ۱) دو دوره ۴۵ و ۱۵ روزه * ۲) دو دوره ۳۰ روزه
 ۳) سه دوره ۲۰ روزه ۴) چهار دوره ۱۵ روزه
- (۲۵)-ارزش گوشتی کدام نژاد کمتر است؟
 ۱) براون سوئیس ۲) جرسی * ۳) هولشتاین ۴) سیستانی
- (۲۶)-عملی ترین تشخیص آبستنی در گاو کدام است?
 ۱) آزمایش شیر ۲) آزمایش ادرار ۳) آزمایش خون ۴) لمس مقعدی *

- ۲۷-کدام یک از موارد زیر در افزایش چربی شیر تاثیر دارد؟**
- (۱) تغذیه کنسانتره
 - (۲) تغذیه علوفه سبز
 - (۳) مخلوط نمودن غذا *
- ۲۸-درصد چربی شیر گاو در زمان شیردوشی:**
- (۱) در انتهای شیردوشی زیادتر است *
 - (۲) در ابتدای شیردوشی زیادتر است
 - (۳) ثابت است
- ۲۹-از نقطه نظر اقتصادی فاصله گوساله زایی مطلوب برای زایش دوم بعد از چند مدت است؟**
- | | | | |
|--------------|--------------|------------|-----------|
| (۱) ۵/۱۴ ماه | (۲) ۱۳ ماه * | (۳) ۱۱ ماه | (۴) ۴ ماه |
|--------------|--------------|------------|-----------|
- ۳۰-در برنامه کنترل ورم پستان چه اقداماتی ضروری است؟**
- (۱) بررسی ماشین شیردوشی
 - (۲) ضدعفونی پستانک ها قبل از شیردوشی
 - (۳) درمان ورم پستان ها *
 - (۴) همه موارد *
- ۳۱-معده نشخوارکنندگان از چند قسمت تشکیل شده است؟**
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| (۱) یک قسمت | (۲) دو قسمت | (۳) سه قسمت | (۴) چهار قسمت * |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
- ۳۲-در گاوداریهای صنعتی بیشتر از کدام علوفه استفاده می شود؟**
- | | | | |
|----------|-------------|------------|-----------|
| (۱) شبدر | (۲) یونجه * | (۳) چاودار | (۴) اشپرس |
|----------|-------------|------------|-----------|
- ۳۳-صرف نان خشک در ماههای آخر آبستنی:**
- | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| (۱) زیاد می شود | (۲) مقداری زیاد می شود | (۳) کم می شود * | (۴) تفاوتی ندارد |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
- ۳۴-علائم فحلی در گاو بطور متوسط هر :**
- | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (۱) ۳۰ روزگی * | (۲) ۲۵ روزگی | (۳) ۱۵ روزگی | (۴) ۲۱ روزگی * |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
- ۳۵-قسمت خارجی اندام تناسلی دام ماده چه نام دارد؟**
- | | | | |
|------------|----------|-----------|-------------|
| (۱) تخدمان | (۲) تخمک | (۳) فرج * | (۴) هیچکدام |
|------------|----------|-----------|-------------|
- ۳۶-در تلقیح مصنوعی اسپرم در کدام قسمت تخلیه می شود؟**
- | | | | |
|----------|-------------------|----------------|---------------|
| (۱) مهبل | (۲) لوله های رحمی | (۳) گردن رحم * | (۴) همه موارد |
|----------|-------------------|----------------|---------------|
- ۳۷-مدت آبستنی در گاو ماده:**
- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| (۱) ۱۵۲ روز ۱۴۷ | (۲) ۲۷۹-۲۸۵ روز | (۳) ۴۱۰ روز | (۴) ۲۸۰-۲۸۵ روز * |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
- ۳۸-بهترین راه اصلاح نژاد:**
- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| (۱) انتقال جنین | (۲) جفتگیری طبیعی | (۳) تلقیح مصنوعی * | (۴) هیچکدام |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
- ۳۹-سن بلوغ ماده گاوها کدام است؟**
- | | | | |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
| (۱) یک سالگی | (۲) ۱۲ ماهگی | (۳) ۱۵ ماهگی * | (۴) ۲ سالگی |
|--------------|--------------|----------------|-------------|
- ۴۰-تغذیه گوساله تا چند روزگی حساس است ؟**
- | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| (۱) ۲۰ روزگی * | (۲) ۴۰ روزگی | (۳) ۴۵ روزگی | (۴) ۶۰ روزگی |
|----------------|--------------|--------------|--------------|