

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
 رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (ست: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴)
 علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰
 کد سری سؤال: یک (۱)
 استفاده از: — مجاز است.
 زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

امام علی^(ع): شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. راو، سه ملاک برای تفکیک سوء استفاده از مواد از استفاده مرضی مواد را معرفی کرده است. کدام یک از گزینه های زیر این عوامل را معرفی کرده است؟

الف. شدت مصرف، استفاده بیمار گونه، مدت مصرف
 ج. مدت مصرف، شدت مصرف، وجود علائم ترک
 ب. استفاده بیمار گونه، اختلال در وظایف اجتماعی، مدت مصرف
 د. شدت مصرف، وجود علائم ترک، تولرانس یا تحمل

۲. کدام گزینه زیر قدیمی ترین سرزمینی است که مصرف مواد مخدر در آن رواج داشته است؟

الف. ایران
 ب. آمریکای جنوبی
 ج. هندوستان
 د. مصر
 ۳. کدام یک از دانشمندان ایرانی، مطالعاتی درباره تریاک داشته اند؟

الف. زکریای رازی
 ب. ابن سینا
 ج. فارابی
 د. الف و ب
 ۴. قانون تشدید مجازات مواد مخدر در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟

الف. ۱۳۶۱
 ب. ۱۳۷۵
 ج. ۱۳۵۹
 د. ۱۳۸۰

۵. طبق طبقه بندی مواد پروفیسور دونیکر کدام یک از مواد زیر حاصل تحقیقات آزمایشگاهی است؟

الف. مشروبات الکلی
 ب. آمفتامینها
 ج. خواب آورها
 د. ال اس دی
 ۶. کدام یک از گزینه های زیر الکلسم اپسیلون از دیدگاه جلینگ را بیان می کند؟

الف. هر گونه مصرف مشروبات الکلی که برای فرد یا اجتماع زیان آور باشد.
 ب. عوارضی مانند اختلالات فیزیولوژیک، بیماری کبدی و عروقی ایجاد کند.
 ج. در میگساری شدید در چند نوبت فرد بین چند روز تا چند هفته مشروب می خورد
 د. شرب مداوم و سریع توام با ناتوانی از نوشیدن حتی برای زمانی کوتاه

۷. تورم تعداد زیادی از سلولهای اعصاب محیطی، ناتوانی در به یاد آوردن وقایع اخیر و تکمیل نواقص خاطرات با داستانهای تخیلی (افسانه پردازی) از نشانه های کدام یک از نشانه های روانی حاصل از استعمال دراز مدت الکل است؟

الف. نشانگان کورساکوف
 ب. نشانگان ورنیکه
 ج. حمله الکلی
 د. زوال مزمن الکلی
 ۸. مصرف کدام دسته از مواد همراه با الکل بسیار خطرناک است و حتی می تواند منجر به مرگ مصرف کننده شود؟

الف. تریاک و مشتقات آن
 ب. آمفتامینها
 ج. باربیتوراتها
 د. ب و ج
 ۹. کدام یک از نشانه های ترک تریاک و مشتقات آن زودتر بروز می کنند؟

الف. درد عضلانی، تهوع و استفراغ
 ب. تب، اسهال، بی قراری
 ج. شوک و اغتشاش ذهنی
 د. بی قراری، تحریک پذیری و بی خوابی

۱۰. کدام عبارت زیر در مورد آثار مرفین صحیح است؟

الف. موجب افزایش شدید تپش قلب و ایست ناگهانی قلبی می شود.
 ب. موجب یبوست می شود و در گذشته برای درمان اسهال به کار می رفت.
 ج. مانع بروز حالت تهوع شده و برای تسکین درد تجویز می گردد.
 د. آثار آن بر اعضاء و عملکرد فیزیولوژیک بدن هنوز شناخته نشده است.

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (ست: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجميع: ۱۲۱۷۰۶۴)

علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۱۷۰

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: — مجاز است.

زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: — دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

۱۱. ترک اعتیاد به هروئین در چه دوره سنی از همه مشکل تر است؟
 - الف. میانسالی ۴۰ سالگی به بعد
 - ب. پیری ۶۰ سالگی به بعد
 - ج. جوانی زیر ۳۰ سالگی
 - د. تفاوتی ندارد
۱۲. ناراحتیهای قلبی، اختلال دستگاه گوارش، لاغری مفرط، پیری زود رس و سوراخ شدن دیواره داخلی بینی از آثار سوء کدام یک از مواد زیر است؟
 - الف. تریاک و مشتقات آن
 - ب. توهم زها
 - ج. کوکائین
 - د. آمفتامین
۱۳. کانابیس نام دیگر کدام یک از گزینه های زیر است؟
 - الف. حشیش
 - ب. مسکالین
 - ج. فن سیکلیدین
 - د. کافئین
۱۴. آمفتامین ها جزء کدام دسته از مواد محسوب می شوند؟
 - الف. مواد مخدر
 - ب. مواد محرک
 - ج. توهم زها
 - د. خواب آورها
۱۵. انجام عمل دوپینگ که بعضی ورزشکاران مرتکب آن می شوند مربوط به مصرف کدام یک از مواد زیر است؟
 - الف. الکل
 - ب. متادون
 - ج. مسکالین
 - د. آمفتامینها
۱۶. گم گشتگی عاطفی، وحشت، اختلالات سایکوتیک، احساس بزرگ شدن جسم و کسب توانایی پرواز از علائم مسمومیت با کدام ماده زیر است؟
 - الف. تریاک و مشتقات آن
 - ب. ماری جوانا
 - ج. ال اس دی
 - د. مسکالین
۱۷. حشیش دارای کدام یک از آثار زیر است؟
 - الف. آثار کیف زا
 - ب. آثار تحریک کننده
 - ج. آثار توهم زا
 - د. همه موارد
۱۸. کدام گزینه در مورد کافیین موثر است؟
 - الف. به دلیل کاهش آستانه تحریک، تحریک پذیری نوروها را افزایش می دهد.
 - ب. اثرات آرامبخش دارد و فرد را دچار خواب آلودگی و کسالت می کند.
 - ج. اثرات تشنج آفرینی آن از تنوفیلین بیشتر است و تحریکات مغزی خطرناکی ایجاد می کند.
 - د. دارای اثرات توهم زایی و کیف آور است .
۱۹. مصرف سیگار در کدام گروه زیر بیشتر است؟
 - الف. بیماران افسرده
 - ب. بیماران دو قطبی
 - ج. بیماران اسکیزوفرن
 - د. افراد عادی
۲۰. مطالعات خانوادگی که در مورد الکلیسم در دنیا انجام شده است، کدام گزینه زیر را تایید می کند؟
 - الف. الکلیسم ارتباطی با مصرف این مواد در خانواده فرد ندارد.
 - ب. عیار الکلیسم در بستگان این بیماران به مراتب بیش از جمعیت کلی است.
 - ج. مطالعات مذکور هنوز پاسخ روشنی به دست نداده اند.
 - د. ۵۰٪ افراد معتاد به الکل دارای خانواده های الکلی بوده اند.

نام درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)

رشته تحصیلی و کد درس: روانشناسی (ستی: ۱۲۱۷۰۲۳ - تجمیع: ۱۲۱۷۰۶۴)

علوم اجتماعی (مددکاری) ۱۲۲۲۱۷۰

کد سری سؤال: یک (۱)

استفاده از: —

مجاز است.

زمان آزمون: تستی: ۴۵ تشریحی: - دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

۲۱. دیدگاه روان کاوی الکلیسم را چگونه توجیه می کند؟

الف. مشروب خواری بازگشت به مرحله دهانی است.

ب. فرد الکلیک فاقد بخش خودآگاه شخصیت است.

ج. مشروب خواری برای کاهش اضطراب و محرومیت است.

د. افراد برای آنکه از پس مسائل زندگی برآیند مشروب خواری می کنند

۲۲. کدام یک از گروههای شخصیتی زیر آمادگی بیشتری برای استفاده از مواد مخدر دارند؟

الف. افراد نوراتیک ب. افراد هیستریک ج. افراد خودشیفته د. افراد ضد اجتماعی

۲۳. در دیدگاه کنبرگ کدام گروه شخصیتی ، مناسب ترین گروه برای درمان تلقی می شوند؟

الف. شخصیت دپرسیومازوخیست ب. شخصیت اسکیزوئید

ج. شخصیت خودشیفته د. شخصیت پارانوئید

۲۴. از نظر جامعه شناسان معتقد به دیدگاه بر چسب اجتماعی اینکه مصرف کدام مواد ممنوع و انحرافی تلقی شود به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

الف. موادی که با هنجارهای اجتماعی در تعارض باشند. ب. موادی که صاحبان قدرت آنها را نپذیرند.

ج. موادی که مصرف آنها با ارزشهای اجتماعی در تضاد باشد. د. موادی که عملکرد اجتماعی فرد را با اختلال شدید مواجه کند.

۲۵. از نظر نایت امکان اعتیاد به الکل در کدام گروه از کودکان زیر بیشتر است؟

الف. کودکانی که مورد بی مهری والدین قرار می گیرند. ب. کودکانی که مورد سرزنش و تنبیه شدید قرار می گیرند.

ج. کودکانی که در خانواده های فاقد پدر و مادر زندگی می کنند. د. کودکانی که مورد توجه افراطی والدین اند.

۲۶. روش معمول برای تشخیص اعتیاد، کدام روش زیر است؟

الف. آزمایش خوب ب. آزمایش ادرار ج. تزریق زیر جلدی ان - آلیل نورمرفین د. الف و ب

۲۷. میل شدید به مصرف ، دردهای عضلانی ، اسهال ، تب و بی خوابی از علائم ترک کدام ماده اعتیاد زاست؟

الف. مواد افیونی ب. کوکائین ج. آمفتامین د. مواد توهم زا

۲۸. در کدام یک از روشهای درمانی زیر عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و رشدی را در نظر بگیرند ؟

الف. درمان با متادون ب. درمان بیولوژیکی ج. درمان غیر بیولوژیکی د. درمان با آنتاگونیستهای مواد مخدر

۲۹. ساراسون ، رویکرد درمانی زیست شناختی اعتیاد به الکل را چگونه تعبیر می کند؟

الف. می زدگی نوعی بیماری است و باید بر ضرورت اجتناب کامل از مصرف الکل تاکید کرد.

ب. اعتیاد به الکل حاصل نوعی شرطی شدن است و باید با روش شرطی سازی اجتنابی درمان شود.

ج. اعتیاد به الکل حاصل باورهای غلط و خطاهای شناختی معتاد است و باید آنها را اصلاح کرد.

د. هیچکدام

۳۰. اولین قدم در ترک اعتیاد را کدام گزینه زیر به شکل صحیحی بیان کرده است؟

الف. قطع وابستگی روانی به مواد ب. قطع وابستگی جسمی به مواد

ج. ایجاد شرایط محیطی مناسب برای فرد معتاد د. ارائه آموزشهای لازم برای ایجاد استقامت در صورت ترک اعتیاد