

تعداد سؤال

زمان آزمون (دقیقه)

نام درس: اعتیاد

رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی

کد درس: ۱۲۱۷۰۶۴ - ۱۲۱۷۰۲۳

* دانشجوی گرامی: لطفاً، گزینه ۱ را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر برعهده شما خواهد بود.

* این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. مصرف الکل اختلال در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و همچنین ناتوانی در کنترل زمان ایجاد می‌کند، این تعریف از کیست؟

الف. سازمان بهداشت جهانی

ب. کلر

ج. انجمن پزشکی آمریکا

د. راو

۲. منظور از تولرانس در مصرف مواد چیست؟

الف. وابستگی روانی

ب. وابستگی فیزیولوژیکی

ج. تحمل

د. قطع دارو

۳. علایم کمبود الکل در فرد الکلیسم را چگونه می‌توان کاهش داد؟

الف. کاته کولامین

ب. باریتورات

ج. متادون

د. آمفتامین

۴. هالوسیناسیون یا توهم در اثر مصرف کدام مواد ایجاد می‌شود؟

الف. LSD

ب. باریتورات

ج. هروئین

د. الکل

۵. کدامیک از مواد مخدر اولین بار برای تسکین درد مورد استفاده قرار گرفته است؟

الف. الکل

ب. LSD

ج. هروئین

د. تریاک

۶. در مفهوم تونوس روانی هذیان‌آورها جزء کدام دسته قرار می‌گیرند؟

الف. مختل کننده تونوس

ب. بالابرنده تونوس

ج. پایین آورنده تونوس

د. بدون ارتباط با تونوس روانی

۷. آمادگی‌های شخصی و محیطی بر عکس‌العمل‌های فردی معمولاً تحت تاثیر چه عاملی نمایان می‌شود؟

الف. ایمنی پرامین

ب. پلاسبو

ج. آمفتامین

د. باریتورات

۸. بر طبق نظر لوین فرانسوی کوکائین در کدام طبقه‌بندی قرار دارد؟

الف. خیال انگیزها

ب. سکرآورها

ج. تحریک کننده‌ها

د. نشئه زاهها

۹. اغتشاش روانی در چه میزان غلظت الکل در خون ایجاد می‌شود؟

الف. ۰/۱

ب. ۰/۴

ج. ۰/۳

د. ۰/۵

۱۰. الکلیسمی که وابستگی مستمر به منظور تسکین رنج‌های جسمی و روانی را در پی دارد، در کدام گروه فرعی قرار می‌گیرد؟

الف. آلفا

ب. بتا

ج. گاما

د. دلتا

۱۱. گرایش‌های اسکیزوفرنیک و پارانوئید در چه شرایطی در الکلیسم ظاهر می‌شود؟

الف. میگساری شدید

ب. مسمومیت الکلی

ج. توهم الکلی

د. قطع ناگهانی الکل

۱۲. کدام دارو از دسته بنزو دیازپین‌ها نمی‌باشد؟

الف. ایمنی پرامین

ب. دیازپام

ج. اگزازپام

د. کلردیازپوکسید

۱۳. مرفین چگونه در REM – NON تاثیر می‌گذارد؟

الف. افزایش مرحله ۱ و ۲

ب. کاهش مرحله ۱ و ۲

ج. افزایش مرحله ۲ و ۴

د. کاهش مرحله ۳ و ۴

۱۴. هروئین از نظر فارماکولوژی شبیه چیست؟
الف. تریاک ب. الکل ج. متادون د. مرفین
۱۵. اثر روانی چه ماده‌ای از هروئین هم بیشتر است؟
الف. ال اس دی ب. کوکائین ج. فن سیکلیدین د. آمفتامین
۱۶. کدام ماده موجب افزایش بنیه و کارآمدی کاذب ورزشکاران می‌شود؟
الف. والیوم ب. بنزودیازپین ج. آمفتامین د. مسکالین
۱۷. بازگشت به خاطره‌های گذشته بیشتر در اثر مصرف کدام ماده مخدر ایجاد می‌شود؟
الف. ال اس دی ب. کوکائین ج. آمفتامین د. تریاک
۱۸. قدرت تلقین پذیری بالا اثر کدام ماده است؟
الف. حشیش ب. مسکالین ج. LSD د. فن سیکلیدین
۱۹. حشیش از نظر کیف زایی و تحریک کنندگی به چه موادی نزدیک‌تر است؟
الف. هروئین و ال اس دی ب. تریاک و آمفتامین
ج. آمفتامین و تریاک د. ال اس دی و هروئین
۲۰. علت حساسیت بیشتر بیماران مبتلا به هراس نسبت به کافئین چیست؟
الف. تحریک سیستم گیرنده استیل کولین ب. تحریک سیستم دوپامینرژیک
ج. تحریک سیستم آدرنرژیک د. تحریک گیرنده آدنوزین
۲۱. مطالعات متعدد در مورد الکیسم شدید بیانگر چیست؟
الف. تاثیر معادل عوامل ارثی و محیطی ب. تاثیر نیرومند عوامل ارثی
ج. تاثیر نیرومند عوامل محیطی د. تاثیر بیشتر عوامل ارثی نسبت به عوامل محیطی
۲۲. کمبود کدام ماده در مغز موجب اعتیاد به مواد مخدر است؟
الف. نوراپی نفرین ب. اپی نفرین ج. دوپامین د. آندروفین
۲۳. فروید نوشیدن الکل را ناشی از چه می‌دانست؟
الف. مشکلات جنسی ب. احساس محرومیت ج. بازگشت به مرحله دهانی د. برطرف کردن محرومیت
۲۴. کدام شخصیت از مواد مخدر به عنوان جایگزین در ارتباطات بین فردی استفاده می‌کند؟
الف. اسکیزوئید ب. خود شیفته ج. پارانوئید د. ضد اجتماعی
۲۵. در کدام خانواده ممکن است گاهی فرزندان نسبت به مواد مخدر نفرت پیدا کنند؟
الف. معتاد ب. سخت‌گیر ج. سهل‌انگار د. از هم گسیخته
۲۶. هنگام شروع درمان (درحالت اولیه) وضعیت جنسی معتاد چگونه است؟
الف. تحریک پذیری فوق‌العاده جنسی ب. قدرت در رابطه جنسی
ج. توهم جنسی د. سرد مزاجی
۲۷. ترک اعتیاد با متادون معمولاً در چه محدوده زمانی توصیه می‌شود؟
الف. ۲ الی ۳ هفته ب. ۳ الی ۴ هفته ج. ۴ الی ۵ هفته د. ۶ الی ۷ هفته

۲۸. برای درمان کدام مواد نیاز به تجویز ویتامین، تیامین و نیاسین وجود دارد؟

- | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|
| الف. آمفتامین | ب. تریاک | ج. الکلیسم | د. هروئین |
| ۲۹. انزجار درمانی برای درمان می زدگان با کدام دیدگاه تبیین می شود؟ | الف. یادگیری | ب. روان پویایی | ج. شناختی |
| ۳۰. درمان کدام ماده مخدر تنها به درمان حمایتی نیاز دارد؟ | الف. تریاک | ب. آمفتامین | ج. باربیتورات |
| | | | د. فن سیکلیدین |