

۱. کدام یک از موارد زیر جزو ملاک های «راو» برای تشخیص سوء مصرف مواد نیست؟
الف. وجود نحوه استفاده بیمار گونه
ب. اختلال در انجام وظایف اجتماعی
ج. وجود حداقل مصرف سه ماه
د. تمایل به ادامه مصرف با وجود اختلال جسمانی
۲. ظهور مقاومت بدنی یا بافتی در برابر یک ماده چه نام دارد؟
الف. پسیکوپاتولوژی
ب. تحمل
ج. سندرم محرومیت
د. وابستگی دارویی
۳. مشکل سیاسی مواد مخدر، از چه زمانی در ایران آغاز گردید؟
الف. حمله اعراب
ب. حمله مغول
ج. سلسله صفویه
د. سلسله قاجاریه
۴. بر اساس مطالعه انسیتو روانپزشکی ایران درباره اعتیاد، کدام یک از موارد زیر درست است؟
الف. تعداد بیشتر معتادان شهری نسبت به روستایی
ب. تراکم بیشتر معتادان در استان خراسان
ج. تعداد بیشتر افراد دارای تحصیلات قدیم نسبت به سایرین
د. تعداد بیشتر میانسالان نسبت به جوانان
۵. آمفتامین ها جزو کدام گروه از مواد زیر هستند؟
الف. سایکولپتیک ها
ب. سایکو آنالپتیک ها
ج. سایکو دیسلپتیک ها
د. سایکو تریلپتیک ها
۶. کدام یک از مواد زیر دارای مصرف درمانی بسیار اندکی هستند؟
الف. آمفتامین ها
ب. خواب آورها
ج. باریتورات ها
د. توهم زاها
۷. منظور اوگورلیان از معتادان سنتی چیست؟
الف. آنان که به مصرف مواد وفادار می مانند
ب. آنان که مواد را با میزان متفاوت، مصرف می کنند.
ج. آنان که فاقد شناخت از مصرف مواد هستند
د. آنان که از انواع مواد به صورت همزمان مصرف می کنند.
۸. ناتوانی در پرهیز از نوشیدن، حتی برای مدت زمان کوتاه و به صورت شرب سریع و مداوم، به کدام نوع الکلیسم مربوط است؟
الف. آلفا
ب. بتا
ج. دلتا
د. گاما
۹. حمله های الکلی بیشتر در چه مواقعی رخ می دهند؟
الف. پس از مصرف مقدار کم مشروب
ب. پس از مصرف مقدار زیاد مشروب
ج. پس از قطع ناگهانی مصرف مشروب
د. پس از قطع و مصرف مجدد مشروب
۱۰. اسپاسم «پیلور» به هنگام مصرف زیاد الکل به چه حالتی منجر می شود؟
الف. خواب آلودگی و رعشه ب. اضطراب
ج. آتاکسیا
د. تهوع و استفراغ
۱۱. تأثیر بنزودیازپین مشابه با کدام یک از موارد زیر است؟
الف. باریتورات ها
ب. آمفتامین ها
ج. توهم زاها
د. محرک ها
۱۲. کدام یک از موارد زیر مربوط به سندرم ترک در تریاک است؟
الف. تنگی مردمک های چشم
ب. زیاد شدن اشتها
ج. کم شدن خواب
د. کم شدن ضربان قلب

تعداد سؤال: نسی
 زمان امتحان: تستی و تکمیلی

نام درس: اعتیاد (۲ واحد)
 رشته تحصیلی: گرایش: روانشناسی
 کد درس: ۱۲۱۲۸۶

تعداد کل صفحات: ۳

۱۳. اثر مورفین بر ناحیه پستریما در بصل النخاع چیست؟
 الف. افزایش حرارت بدن
 ب. تنگ شدن مردمک چشم
 ج. کاهش قند خون
 د. ایجاد تهوع و استفراغ
۱۴. حالت تکان یا فوران (Flash) ، چه مدت بعد از مصرف هرویین ایجاد می شود؟
 الف. یکی دو دقیقه
 ب. پنج دقیقه
 ج. هفت هشت دقیقه
 د. ده دقیقه
۱۵. کدام یک از موارد زیر مربوط به گزارش کلمن از معتادان زن می باشد؟
 الف. تمایل به هشیار بودن و درک خوب زمان
 ب. عدم ترک اعتیاد به عنوان مکانیزم دلیل تراشی
 ج. تمایل به درک رابطه علت و معلولی در محیط
 د. عدم تشخیص اجبار در به دنبال اعتیاد رفتن
۱۶. مصرف کوکائین به چه صورتی انجام می گیرد؟
 الف. جویدن برگ ها
 ب. استنشاق
 ج. تزریق
 د. هر سه مورد
۱۷. کدام یک از موارد زیر برای درمان پر جنب و جوش کودکان مورد استفاده قرار می گیرد؟
 الف. تریاک
 ب. حشیش
 ج. آمفتامین
 د. ماری جوانا
۱۸. تجربه توهم های حاصله از مصرف کدام ماده را « سفر » می نامند؟
 الف. تریاک
 ب. ال . اس . دی
 ج. حشیش
 د. آمفتامین
۱۹. به عقیده پورو، آخرین مرحله در استعمال کانابیس کدام است؟
 الف. خلسه منجر به خواب
 ب. احساس سعادت شخصی
 ج. خطای حسی
 د. تجزیه وجدان
۲۰. حالت آرام ، بی تحرک و خوشایند که در کشورهای غربی موسوم به « های » است ، مربوط به کدام اثر حشیش می باشد؟
 الف. اثر کیف آور
 ب. اثر تحریک کننده
 ج. اثر توهم زا
 د. اثر فانتازیا
۲۱. اثر نیکوتین کدام یک از موارد زیر است؟
 الف. ایجاد اضطراب و حساسیت زیاد به محرکات
 ب. ایجاد توهم و هذیان
 ج. ضد خستگی و آرامش بخش
 د. بی نیازی به افزایش مصرف
۲۲. از آثار فیزیولوژیک نیکوتین کدام مورد است؟
 الف. کاهش حرکات دودی
 ب. کاهش میزان کاتکولامین
 ج. افزایش میزان متابولیسم
 د. انقباض عروق خون محیطی
۲۳. بر اساس DSM-III ، کدام گروه از افراد زیر مستعد سوء مصرف مواد هستند؟
 الف. دارای اختلال هیستری
 ب. دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 ج. دارای اختلال اجتنابی
 د. دارای اختلال افسردگی
۲۴. به اعتقاد کنبرگ، مناسب ترین گروه برای درمان کدامند؟
 الف. دارای شخصیت دپرسیو مازوخیستیک
 ب. دارای شخصیت اسکیزوئید
 ج. دارای شخصیت خودشیفته
 د. دارای شخصیت ضد اجتماعی پارانوییدی

۲۵. در بین مردم آمریکای جنوبی مصرف کدام ماده شایع تر است؟
الف. هرویین ب. تریاک ج. کوکائین د. الکل
۲۶. به نظر کلمن، علت گرایش جوانان معتاد به فرهنگ های فرعی چیست؟
الف. بدست آوردن پایگاه اجتماعی بالاتر
ب. آشنا شدن با مقررات جامعه از طریق آنها
ج. توانا تر شدن در پاسخ گویی به انتظارات جامعه
د. سهولت به دست آوردن ماده مصرفی
۲۷. در مقایسه خانواده های معتادان و غیر معتادان کدام یک از موارد زیر در خانواده های افراد معتاد شیوع بیشتری داشته است و از علل اساسی می باشد؟
الف. عدم وجود رابطه صمیمی بین پدر و مادر ب. رفتار سلطه جویانه مادر
ج. عدم وجود طرح مشخص برای تربیت فرزند د. رابطه ضعیف پسر و مادر
۲۸. ترک تدریجی دارو در کدام یک از موارد زیر رایج تر است؟
الف. آمفتامین ب. هرویین ج. کوکائین د. مسکالین
۲۹. اثرات دارویی متادون، پس از جذب چه مدت در بدن باقی می ماند؟
الف. یک ساعت ب. سه ساعت ج. یک روز د. یک شبانه روز
۳۰. در مورد درمان الکلیسم، کدام یک از موارد زیر درست است؟
الف. برای ترک باید مصرف به اواخر هفته محدود شود.
ب. کسانی که از جانب نزدیکان تحت فشارند کمتر ترک می کنند.
ج. داوطلبان درمان، پیش آگهی بهتری دارند.
د. روان درمانی بیشتر از سایر روشها برای ترک بکار می رود.

کلید سوالات درس اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن) (کد :
در نیمسال پاییز سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶

| شماره | کلید سوال | توضیحات و املاهی | شماره | کلید سوال | توضیحات و املاهی |
|-------|-----------|------------------|-------|-----------|------------------|
| ۱ | گزینه ج | | ۱۶ | گزینه د | |
| ۲ | گزینه ب | | ۱۷ | گزینه ج | |
| ۳ | گزینه د | | ۱۸ | گزینه ب | |
| ۴ | گزینه الف | | ۱۹ | گزینه الف | |
| ۵ | گزینه ب | | ۲۰ | گزینه الف | |
| ۶ | گزینه د | | ۲۱ | گزینه ج | |
| ۷ | گزینه الف | | ۲۲ | گزینه د | |
| ۸ | گزینه ج | | ۲۳ | گزینه ب | |
| ۹ | گزینه ب | | ۲۴ | گزینه الف | |
| ۱۰ | گزینه د | | ۲۵ | گزینه ج | |
| ۱۱ | گزینه الف | | ۲۶ | گزینه د | |
| ۱۲ | گزینه ج | | ۲۷ | گزینه الف | |
| ۱۳ | گزینه د | | ۲۸ | گزینه ب | |
| ۱۴ | گزینه الف | | ۲۹ | گزینه د | |
| ۱۵ | گزینه ب | | ۳۰ | گزینه ج | |