

۱. الکلسم اختلالات فیزیولوژیکی، روانشناختی و یا اجتماعی می باشد که با مصرف مستمر و مفرط الکل ارتباط دارد، این تعریف از کیست؟
  - الف. سازمان بهداشت جهانی
  - ب. انجمن پزشکی آمریکا
  - ج. DSM-III
  - د. جلینگ
۲. کدامیک از ملاکهای سوء استفاده از مواد در نظریه راو مطرح نشده است؟
  - الف. اختلال در انجام وظایف شغلی
  - ب. اختلال در انجام وظایف اجتماعی
  - ج. حداقل مدت مصرف دو ماه
  - د. استفاده بیمارگونه
۳. مصرف مرتب یک مقدار مواد موجب کاهش اثر دارو می شود، این پدیده چه نامیده می شود؟
  - الف. وابستگی روانشناختی
  - ب. وابستگی فیزیولوژیکی
  - ج. تحمل
  - د. مسمومیت
۴. علایم کمبود هروئین در افراد معتاد را چگونه می توان کاهش داد؟
  - الف. متادون
  - ب. باریتورات
  - ج. کاته کولامین
  - د. آمفتامین
۵. مواد موجود در شربت سینه ساخت کارخانه ساندوز بعدها در چه ماده مخدری دیده شد؟
  - الف. LSD
  - ب. حشیش
  - ج. هروئین
  - د. تریاک
۶. در مفهوم تونوس روانی آمفتامین ها جزء کدام دسته قرار می گیرند؟
  - الف. بالابرنده تونوس
  - ب. پایین آورنده تونوس
  - ج. مختل کننده تونوس
  - د. بدون ارتباط با تونوس روانی
۷. کدام مواد مخدر می توانند پسیکوزهای دارویی ایجاد کنند؟
  - الف. هروئین
  - ب. آمفتامین
  - ج. باریتورات
  - د. امی پرامین
۸. برای فن سیکلیدین ها در کدام طبقه بندی مواد مخدر، طبقه جداگانه ای در نظر گرفته شده است؟
  - الف. پروفوسور دونیکر
  - ب. اوگورلیان
  - ج. پورو
  - د. DSM-III-R
۹. مستی الکلی در چه میزان غلظت الکل در خون ایجاد می شود؟
  - الف. ۰/۵
  - ب. ۰/۱ تا ۰/۱۵
  - ج. ۰/۴ تا ۰/۵
  - د. بیش از ۰/۵
۱۰. الکیسمی که به نام سوماتوپاتیک نیز نامیده می شود، در کدام گروه فرعی قرار می گیرد؟
  - الف. آلفا
  - ب. بتا
  - ج. دلتا
  - د. اپسیلون
۱۱. خطای ادراک و توهم معمولاً در چه شرایطی در الکیسم ظاهر می شود؟
  - الف. قطع ناگهانی الکل
  - ب. مسمومیت الکلی
  - ج. حمله الکلی
  - د. توهم الکلی
۱۲. عدم تعادل در ایستادن و یا راه رفتن بیانگر کدام اختلال در افراد الکیسم می باشد؟
  - الف. نشانگان ورنیک
  - ب. نشانگان کورساکف
  - ج. زوال مزمن الکلی
  - د. سندرم الکل
۱۳. کدامیک از الکالوئیدهای تریاک نمی باشد؟
  - الف. دیازپام
  - ب. ناکوتین
  - ج. کدئین
  - د. نارسئین
۱۴. از بین مشتقات تریاک کدام آثار خفیف تری دارد؟
  - الف. ناکوتین
  - ب. نارسئین
  - ج. مرفین
  - د. کدئین
۱۵. احساسی مانند گل کردن، ذوق و هشیاری مفرط، حالت نشئه، سرخوشی و خود برتری بینی ناشی از کوکائین چه نامیده می شود؟
  - الف. جرقه
  - ب. فراز
  - ج. تحریک
  - د. فلش

۱۶. کدام ماده مخدر برخلاف هروئین وابستگی فیزیکی ایجاد نمی‌کند؟

الف. LSD ب. فن سیکلیدین ج. کوکائین د. مسکالین

۱۷. پارانو یا از مشخصه‌های فکری کدام ماده مخدر می‌باشد؟

الف. هروئین ب. باریتورات ج. آمفتامین د. کاته کولامین

۱۸. تجربه زیبایی اثر کدام ماده مخدر است؟

الف. کوکائین ب. ال اس دی ج. حشیش د. فن سیکلیدین

۱۹. فانتازای ناشی از مصرف زیاد حشیش دارای چه ویژگی است؟

الف. هذیان خشونت آمیز ب. تلقین پذیری ج. نشئگی د. خودببینگی

۲۰. کدام نوشیدنی دارای ترکیب کافئین و تتوفیلین است؟

الف. نسکافه ب. کوکاکولا ج. قهوه د. چای

۲۱. مصرف ماری جوانا در مردان چه اثری ایجاد می‌کند؟

الف. افزایش فعالیت جنسی ب. توقف هومون‌های مردانه

ج. کاهش فعالیت جنسی د. افزایش هورمون‌های مردانه

۲۲. مطالعات متعدد در مورد الکلیسم خفیف بیانگر چیست؟

الف. تأثیر بیشتر عوامل ارثی ب. تأثیر بیشتر عوامل محیطی

ج. تأثیر اندک عوامل ارثی و محیطی د. تأثیر معادل عوامل ارثی و محیطی

۲۳. آدلر نوشیدن الکل را ناشی از چه می‌دانست؟

الف. برطرف کردن احساس پوچی ب. بازگشت به مرحله دهانی

ج. یأس و سرخوردگی د. فرار از حقارت

۲۴. در طبقه بندی DSM-III مصرف مواد بیانگر کدام شخصیت می‌باشد؟

الف. افسرده ب. وسواس ج. ضد اجتماعی د. مضطرب

۲۵. کدام دیدگاه نقش اطرافیان را در اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم می‌داند؟

الف. چاین ب. کلمن ج. فریمان د. گریگوری

۲۶. در کدام نوع خانواده احتمال کمتری وجود دارد که فرزندان به طرف مواد مخدرگراش پیدا کنند؟

الف. همه سالار ب. سخت گیر ج. سهل انگار د. آزاد

۲۷. ترک ناگهانی در کدام نوع اعتیاد خطر مرگ دارد؟

الف. آمفتامین ب. باریتورات ج. هروئین د. کوکائین

۲۸. اثرات دارویی متادون پس از جذب چه مدت در بدن باقی می‌ماند؟

الف. ۱۲ ساعت ب. ۲۴ ساعت ج. ۳۶ ساعت د. ۴۸ ساعت

۲۹. منبع اصلی نیروی میگساران بی‌نام (گمنام) چیست؟

الف. ارتباط با خدا ب. دوباره اجتماعی شدن ج. جلسات گروهی د. حمایت‌های مردمی

۳۰. مهارتهای حل مسأله در درمان می‌زدگان با کدام دیدگاه تبیین می‌شود؟

الف. شناختی ب. یادگیری ج. روانکاری د. روان پویایی